



***PLECOTUS MACROBULLARIS* – (KUZJAKIN, 1965)**

Orecchione alpino, Orecchione montano

Famiglia

Vespertilionidi (*Vespertilionidae*).

Parametri biometrici

LCo (48,4) 51,2 (55,4) mm; AV (39,8) 40,8 (42,2) mm; LO (14) 16-21 mm; LT (15,2) 16,5 (17,7); LPO (6,0) 7,04 (7,6); P (7,0) 8,4 (9,5) g.

Geonemia

Specie di nuova descrizione per la quale non sono ancora noti dati distributivi utili a definire l'areale.

Attualmente, in Italia, (Figura 2.32) si hanno segnalazioni della specie esclusivamente per il Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria (Spitzenberger *et al.*, 2002; 2003; Chirichella *et al.*, 2003; Trizio *et al.*, 2003; Kiefer e von Helversen, 2004; Trizio *et al.* in press).

Movimenti migratori

Specie simile a *P. auritus*, probabilmente da considerarsi sedentaria.

Habitat

I pochi dati a disposizione indicherebbero un uso dell'habitat simile a *P. auritus*. *Plecotus macrobullaris* sembrerebbe preferire altitudini leggermente inferiori rispetto all'Orecchione.

Alimentazione

Attualmente non nota.

Comportamento riproduttivo

Colonie riproduttive di dimensioni simili a *P. auritus*: 10-30 femmine adulte. Parti in giugno-luglio: sino ad ora accertato un unico piccolo per parto.



Distribuzione di Orecchione alpino in Italia. In grigio le regioni interessate da almeno un dato di presenza certa a partire dal 2001. La mancanza di indicazioni per alcune regioni non è necessariamente dovuta a una sicura assenza della specie ma può anche dipendere da una insufficiente conoscenza dell'area, in particolare in relazione alla recente segnalazione della specie in Italia.