

***PLECOTUS SARDUS*, MUCEDDA ET AL., 2002 N.S.**

Orecchione sardo

Famiglia

Vespertilionidi (*Vespertilionidae*).

Parametri biometrici

LTT 45 mm; LCo 51 mm; AV 40,9-42,3 mm; LFM-IV-1 non misurato; LFM-IV-2 non misurato; LO 37,5-39 mm; AA non misurato; Lcb 15,9 mm; FdC-M³ 5,75 mm; P 6,5-9,5 g; DB 4,75 mm; LD-V 56 mm; LPO 6-6,4; LT 18-19,8; Larghezza trago 6-6,5.

Geonemia

In relazione ai dati attualmente a disposizione risulta essere l'unica specie di chirottero endemica dell'Italia, in particolare limitata alla parte centrale della Sardegna.

Movimenti migratori

Ancora poco conosciuti anche se probabilmente da considerarsi sedentaria. Sembra compiere solo brevi spostamenti stagionali.

Habitat

Segnalata sinora solo a quote medio-basse, in habitat boschivi. Pochissime colonie riproduttive note in cavità carsiche e edifici e pochissimi siti di svernamento in edifici.

Niente è noto, attualmente, sulle strategie di caccia.

Alimentazione

Attualmente non nota.

Comportamento riproduttivo

Attualmente non noto anche se presumibilmente simile a *P. auritus*.

Rapporti con altre specie

Attualmente non noti.

Status

Non valutata (*taxon* di recente descrizione).



Distribuzione di Orecchione sardo in Italia. In grigio le regioni interessate da almeno un dato di presenza certa a partire dal 2002. La mancanza di indicazioni per alcune regioni non è necessariamente dovuta a una sicura assenza della specie ma può anche dipendere da una insufficiente conoscenza dell'area. La recente descrizione della specie in Sardegna fa comunque supporre che la sua distribuzione sia limitata all'area sardo-corsa.